

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE

CURSO – ODONTOLOGIA

GABARITO OFICIAL

TESTE DE PROGRESSO 2024.2

Data: 13/11/2024

Questão	Gabarito	Comentário
1	D	A imperícia está relacionada à falta de qualificação técnica ou teórica, ou à inaptidão do profissional para realizar certos procedimentos
2	C	A sequência correta para os procedimentos de esterilização de instrumentais é: Pré-lavagem → Lavagem → Secagem → Embalagem → Esterilização → Acondicionamento
3	A	A municipalização traduz o discurso sanitário em um desenho organizativo que elege o município como a base operativa do sistema de saúde.
4	C	A DO é o documento básico para gerar os dados de mortalidade, sendo implantada como instrumento único para alimentação do SIM.
5	C	Um líder trabalha em conjunto com a equipe, chama os funcionários para buscarem um objetivo juntos. Além de mostrarem como o trabalho deve ser feito e oferecer todo o suporte necessário para que a equipe consiga executar bem a tarefa. Já o gestor, delega o que deve ser feito. Depois de explicar o trabalho, a execução é completa por parte do funcionário. Outra diferença muito clara entre os dois é que o gerente é singular, ou seja, fala muito na questão do “eu”.
6	A	Autonomia – é o respeito pela capacidade dos indivíduos de tomar suas próprias decisões, considerando seus valores e crenças
7	B	PubMed é a alternativa de mostra uma adequada base de dados para pesquisa científica na área de saúde, pois as outras não são bases de dados científicos.
8	D	Posturas inadequadas e repetitivas é exemplo de um risco ocupacional enfrentado pela equipe de saúde bucal e considerado risco ergonômico. <i>Prevenção:</i> Realizar avaliações posturais e adaptar o espaço de trabalho para a saúde do profissional.
9	D	Grupo A, resíduos potencialmente infectantes; Grupo B, resíduos químicos; Grupo D, resíduos comuns; e, Grupo E, resíduos perfurocortantes.
10	D	o papel dos estudantes é Auxiliar no desenvolvimento do problema, identificar hipóteses, realizar pesquisas e colaborar com o tutor, coordenador e secretário
11	B	A educação continuada contempla as atividades que possui período definido para execução e utiliza em sua maior parte, os pressupostos da metodologia de ensino tradicional; já a educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, acontecendo no cotidiano do trabalho

12	D	O scanner como recurso diagnóstico nas moldagens odontológicas apresenta como vantagens a melhor precisão, conforto e rapidez, sem a necessidade de moldeiras.
13	A	O modelo proposto por Dahlgren e Whitehead em 1991, divide os determinantes sociais em camadas, denominando-os de micro, meso e macro determinantes. Os macro determinantes estão situados no último nível e estão relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade e que possuem grande influência sobre as demais camadas.
14	C	um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos são objetivos da Vigilância Epidemiológica
15	D	Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Das alternativas, o único que se coloca como um DSS frente a polarização da doença cárie é a ausência de água encanada e saneamento básico.
16	A	Equidade. Os princípios doutrinários do SUS são: I) a universalidade; II) a integralidade; III) a equidade da assistência, pressupondo o “tratamento desigual para os desiguais”, em que é dada prioridade aos casos que demandam maior necessidade.
17	C	O Projeto Terapêutico Singular é uma ferramenta indicada para ser utilizada com usuários ou famílias em situações mais graves ou difíceis
18	C	Conselho Tutelar do Município. Em caso suspeita de maus-tratos contra crianças e adolescentes, o cirurgião dentista deverá obrigatoriamente notificar o caso aos órgãos de proteção. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou o adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Na falta do Conselho Tutelar, deve-se comunicar ao Juizado da Infância e da Juventude.
19	B	João deve ser encaminhado com eliminação da dor e com ações realizadas para controle da infecção bucal (adequação do meio bucal, terapia periodontal básica remoção dos focos de infecção e selamento provisório das cavidades de cárie).
20	D	Os movimentos que ocorrem com a mandíbula centralizada são chamados movimentos cêntricos e compreendem principalmente a abertura e o fechamento de pequena amplitude.
21	A	Podemos definir as miíases como afecções causadas pela presença de larvas de moscas em órgãos e tecidos do homem ou de outros animais vertebrados, onde elas se nutrem e desenvolvem como parasitos.

<p>22</p> <p>FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO</p>	<p>A</p>	<p>Oncogenes são genes que induzem um fenótipo transformado quando expressos nas células, promovendo o aumento do crescimento celular. Uma descoberta importante no câncer foi a percepção de que os oncogenes são versões mutadas ou superexpressas de genes celulares normais, que são chamados proto-oncogenes. A maioria dos oncogenes codifica fatores de transcrição, fatores que participam de vias de sinalização pró-crescimento ou fatores que aumentam a sobrevivência celular. Atualmente, eles são considerados genes dominantes porque uma mutação envolvendo um único alelo é suficiente para produzir um efeito pró-oncogênico.</p>
<p>23</p>	<p>C</p>	<p>a indicação correta de ortodontia interceptativa é após a manifestação dos problemas ortodônticos</p>
<p>24</p>	<p>A</p>	<p>No corpo ocorrem dois tipos básicos de imunidade adquirida. Em um deles o corpo desenvolve anticorpos circulantes após o ataque do agente invasor. A célula responsável pela produção dos anticorpos é o Linfócito B.</p>
<p>25</p>	<p>A</p>	<p>Na presença de flúor, tem-se a ingestão de açúcar. A saliva em pH inferior a 5,5 encontra-se subsaturada em relação ao produto de solubilidade da hidroxiapatita (HA). Em presença de flúor, porém, apesar de o pH chegar até a 4,5, tem-se o meio supersaturado em relação ao produto de solubilidade da fluorapatita (FA); portanto, o dente perde Ca⁺⁺ e PO⁻⁴ na forma de hidroxiapatita (HA), mas também ganha Ca⁺⁺ e PO⁻⁴ na forma de FA.</p>
<p>26</p>	<p>C</p>	<p>Os principais sinais e sintomas do tétano são: trismo, disfagia, hipertonia da musculatura facial da mímica, repuxamento das narinas e da comissura labial (ocasionando o riso sardônico), comprometimento da musculatura cervical e alterações respiratórias.</p> <p>O tratamento do tétano deverá combater o <i>clostridium tetani</i> no foco de infecção, neutralização das toxinas ainda não fixadas nos receptores, controles de sinais e sintomas através de sedativos e miorelaxantes, imunização ativa dos enfermos e medidas de manutenção (adequação de hidratação, aporte calórico, prevenção de infecções e escaras, tratamento de infecções secundárias, uso de sonda vesical se houver retenção urinária), atendimento à insuficiência respiratória e cuidados gerais</p>
<p>27</p>	<p>C</p>	<p>A HMI se manifesta como opacidades demarcadas de coloração que variam de branco ao amarelo acastanhado e podem sofrer fraturas logo após a irrupção do dente. A cor da opacidade está relacionada à qualidade da mineralização da superfície do esmalte. Quanto mais escura for a opacidade, maior a porosidade da superfície e, portanto, maior a probabilidade de fraturas pós-eruptivas e de cárie dentária.</p>
<p>28</p>	<p>D</p>	<p>Indicações e contra-indicações para pulpectomia em dentes decíduos: 1. Dentes decíduos com lesão de cárie ou restauração defeituosa associada a sinais ou sintomas de pulpíte irreversível; 2. Dor espontânea ou persistente que desaparece após algum tempo; 3. Presença de eritema</p>

<p>FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE</p>		<p>localizado, fístula, edema ou mobilidade acentuada, comparada com o contralateral; 4. Alteração de cor para tons de cinza; 5. Reabsorção radicular interna; 6. Confirmação após a abertura da câmara pulpar do diagnóstico de ausência de vitalidade pulpar, caracterizada pelo sangramento acentuado, que não cessa após alguns minutos, e pela presença de sangue com coloração alterada ou tecido pulpar liquefeito; 7. Dentes decíduos com necrose pulpar com ou sem lesão inter ou perirradicular visível radiograficamente; 8. Dentes com vitalidade pulpar, que sofreram traumatismo dental com exposição pulpar em um intervalo de tempo superior a 24 horas.</p>
<p>29</p>	<p>D</p>	<p>A fibrose gengival é causada pelo atrito superficial dos alimentos durante a mastigação, sendo mais frequente sobre os incisivos centrais superiores por esfoliações ou perda precoce dos dentes predecessores.16 Com o objetivo de permitir um caminho livre para esse dente vir a ocupar sua posição no arco dentário, o odontopediatra pode realizar um procedimento cirúrgico, denominado ulectomia, que consiste na remoção dos tecidos que revestem a face incisal ou oclusal da coroa dentária de um dente decíduo ou permanente não irrompido.</p>
<p>30</p>	<p>D</p>	<p>O Movimento de exploração ou cateterismo apresenta na sua cinemática: pequenos avanços em sentido apical associados a discretos movimentos rotacionais à direita e à esquerda com pequenos retrocessos. Tem como Indicações: exploração do canal radicular, esvaziamento inicial e determinação do comprimento de trabalho de modelagem (CTM)</p>
<p>31</p>	<p>B</p>	<p>Todo paciente com periodontite deve ser rastreado para diabetes. Grau C = HbA1c \geq 7,0%; diante de um paciente com diabetes e periodontite com dificuldade de controle glicêmico, o médico deve encaminhar o paciente para tratamento periodontal antes de prescrever uma nova medicação hipoglicemiante dado que o tratamento da periodontite traz benefícios no controle glicêmico equivalentes à inclusão de mais uma droga; e, o diabetes aumenta a atividade colagenolítica.</p>
<p>32</p>	<p>D</p>	<p>Dentre as vantagens e desvantagens relacionadas ao tratamento restaurador indireto, estão: preparo menos conservador; contorno anatômico com facilidade de trabalhar sobre troquel de gesso; tempo clínico de 2 ou mais sessões e união ao dente mediada por cimento resinoso.</p>
<p>33</p>	<p>A</p>	<p>A localização da terminação marginal em esmalte aumenta de forma significativa a longevidade dessas res- taurações, que dependem do uso de sistemas de cimentação resinosos para a colagem de restaurações cerâ- micas sensíveis ao ácido hidrófluorídrico, que promove as microrretenções necessárias à fixação. Essas cerâmicas são conhecidas como cerâmicas vítreas ou feldspáticas, que podem ser reforçadas por cristais de alumina ou leucita, além de se apresentar em outras formas cris- talinas, como o dissilicato de lítio ou a fluorapatita do sistema IPS e.max (Ivoclar/Vivadent). Além de promover uma excelente união entre cimento e cerâmica por meio do condicionamento com ácido fluorídrico</p>

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE		e silanização, tais cerâmicas ainda aumentam a resistência mecânica dessas restaurações cerâmicas, também conhecidas como ácido-sensíveis.
34	D	A biópsia ambulatorial é um procedimento diagnóstico que envolve a remoção de um fragmento de tecido, geralmente realizado sob anestesia local, indicado para lesões que apresentam características suspeitas, como ulcerações persistentes ou alterações de cor.
35	B	Assistência aos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva, pode-se realizar procedimentos cirúrgicos à beira leito.
36	A	A distância mínima que a face distal do implante deve estar à frente dessa região para que o procedimento não cause nenhuma alteração sensorial no paciente é 2 mm
37	C	Reações alérgicas são exemplos de efeitos indesejáveis pode ocorrer com o uso de anestésicos locais em odontologia
38	C	Lábio, rebordo alveolar e o palato anteriormente ao forame incisivo As fissuras de lábio afetam estruturas derivadas do palato primário, podendo acometer não só o lábio, mas também o rebordo alveolar e o palato anteriormente ao forame incisivo. São causadas por falha de nivelamento entre o segmento intermaxilar (lembrando que essa estrutura é resultante da união dos processos nasais mediais) e o processo maxilar, do lado direito ou esquerdo (unilaterais), ou, ainda, de ambos os lados (bilaterais). As fissuras de lábio também podem ocorrer por falha de nivelamento entre os processos nasais mediais, na região da linha média, dando origem às fissuras de lábio medianas.
39	C	Deve-se evitar a prescrição de paracetamol e de alguns anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para pacientes fazendo uso contínuo de varfarina, anticoagulante empregado na prevenção de fenômenos tromboembólicos, pelo risco de aumentar a atividade da varfarina e predispor à hemorragia.
40	C	São exemplos de anestésicos do grupo amida: Lidocaína, mepivacaína e articaína. Benzocaína e propoxicaína pertencem ao grupo éster de anestésicos locais.
41	A	Prilocaína 3% pode fornecer risco de metemoglobinemia se administrado nesta paciente com suspeita de gravidez
42	D	Como todo e qualquer medicamento produz efeitos terapêuticos desejáveis e efeitos adversos, uma das formas de se estabelecer a segurança clínica de um medicamento é dividir o valor de sua dose letal mediana pelo valor de sua dose eficaz mediana. A relação DL50/DE50 é denominada índice terapêutico, que às vezes está contido nas informações técnicas das bulas dos medicamentos. Esse índice confere uma segurança relativa quando apresenta valores superiores a 10. Portanto, os pacientes em uso de medicamentos com baixo índice terapêutico devem ser periodicamente monitorados, pela possibilidade de apresentarem efeitos tóxicos ou interações medicamentosas clinicamente relevantes.

43	B	Os anti-histamínicos de primeira geração podem ser utilizados para sedação leve em pacientes ansiosos, pois possuem propriedades sedativas, mas devem ser prescritos com cautela devido ao risco de sonolência.
44	C	A pericoronarite Quando aguda, o episódio tende a ser único, com duração curta, podendo apresentar ulceração de mucosa, edema, sangramento local e trismo
45	D	atitude o cirurgião-dentista pode fazer para prevenir lípotímia é avaliar o grau de ansiedade, e em situações de ansiedade elevada considerar sedação mínima
46	A	São recursos são considerados essenciais para prestar primeiros socorros em um consultório odontológico: Kit de primeiros socorros, oxigênio suplementar, monitor cardíaco, aparelho de glicemia
47	A	Em dentes com rizogênese incompleta diante de exposições maiores e/ou de períodos mais longos decorridos entre o trauma e o tratamento, opta-se pela curetagem pulpar ou pela pulpotomia
48	C	As soft skills envolvem habilidades de desenvolvimento emocional, comportamental e cognitivo, como a comunicação, o pensamento crítico e estruturado, a resolução de problemas, a capacidade de trabalho em equipe, a negociação, a consciência cultural, a sociabilidade, a empatia e o respeito à diversidade, entre outras. A literatura mostra que ensinar os profissionais de saúde a praticarem a validação empática que se refere à capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e experiências de outra pessoa, pode facilitar a comunicação e fazer com que os pacientes se sintam mais aceitos e satisfeitos com seus tratamentos
49	D	O primeiro passo do modelo SPIKES é "Setting up the interview", que se refere à importância de criar um ambiente apropriado para a comunicação. Isso envolve garantir privacidade, um local confortável e tempo suficiente para discutir as informações com o paciente, permitindo que ele processe a notícia e faça perguntas. As opções A, B e D são passos que devem ser realizados posteriormente no processo de comunicação empática.
50	C	A Comunicação Não Violenta sugere que, ao lidar com conflitos, é essencial primeiro identificar e expressar nossos próprios sentimentos em relação à situação. Isso ajuda a estabelecer um espaço de empatia e compreensão, permitindo um diálogo mais aberto e respeitoso. As outras opções não promovem um ambiente de comunicação empática e podem agravar a situação.